Die Komplexchemie des Methylquecksilberkations

Doctoral Thesis**Author(s):**

Schellenberg, Matthias

Publication date:

1963

Permanent link:

<https://doi.org/10.3929/ethz-a-000089166>

Rights / license:

In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

Prom. Nr. 3408

Die Komplexchemie des Methylquecksilberkations

Von der
EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN
HOCHSCHULE IN ZÜRICH

zur Erlangung
der Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften
genehmigte

PROMOTIONSARBEIT

vorgelegt von
MATTHIAS SCHELLENBERG
dipl. Ing.-Chem. E. T. H.
von Winterthur

Referent: Herr Prof. Dr. G. Schwarzenbach
Korreferent: Herr P.-D. Dr. W. Schneider

Juris-Verlag Zürich
1963

III. ZUSAMMENFASSUNG

1. Methylquecksilberbromid wurde über eine Grignardreaktion aus HgBr_2 und CH_3Br hergestellt und mit methanolischer Kalilauge zu Methylquecksilberhydroxid umgesetzt. Wässrige Lösungen des Hydroxides erwiesen sich als über Monate unverändert haltbar.
2. Das Kation CH_3Hg^+ ist eine Säure vom $\text{pK} = 4,59$. Bei der Protonierung von CH_3HgOH tritt als Zwischenprodukt ein binukleares Teilchen $(\text{CH}_3\text{Hg})_2\text{OH}^+$ auf, dessen Bildungskonstante $[(\text{CH}_3\text{Hg})_2\text{OH}]/[\text{CH}_3\text{Hg}][\text{CH}_3\text{HgOH}] = 235$ beträgt.
3. Um die Stabilitäten der Methylquecksilberkomplexe von aprotischen Liganden zu erhalten, wurde das folgende Austauschgleichgewicht untersucht:

Nach dieser Methode wurden die Bildungskonstanten der Methylquecksilberkomplexe von folgenden Liganden bestimmt: Cl^- , Br^- , SCN^- , J^- , $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{PC}_6\text{H}_4\text{SO}_3^-$, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{-S-HgCH}_3$, $\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{NCS}^{2+}$, $\text{Co}(\text{CN})_6^{3-}$.

4. Bei den Untersuchungen der Komplexbildungen mit den basischen Liganden HPO_4^{2-} , HPO_3^{2-} , SO_3^{2-} , NH_3 , en, F^- und $\text{H}_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{SO}_3^-$ war deren Protonierung zu berücksichtigen. Im allgemeinen wurde auch hier das oben erwähnte Austauschgleichgewicht untersucht und aus der Austauschkonstante die Bildungskonstante des betreffenden Komplexes berechnet.
5. Monothioäthylenglycolat, Sulfid und Cyanid bilden extrem stabile Methylquecksilberkomplexe. Ihre Bildungsgleichgewichte konnten nur untersucht werden, indem man den Lösungen einen Hilfskomplexbildner zusetzte, um die Konzentration des freien CH_3Hg^+ zu erniedrigen. Der Cyanokomplex wurde nach der pHg-Methode untersucht.
6. Die violetten Methylquecksilberkomplexe von p,p'-Dimethylaminothiobenzophenon (Thiomichler'sches Keton) und p-Dimethylaminobenzalrhodanin wurden spektrophotometrisch untersucht.
7. Für einige Komplexe anionischer Liganden wurden die Wärmetönungen ΔH der Assoziationsreaktion $\text{CH}_3\text{Hg}^+ + \text{B}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{HgB}$ gemessen. Aus den Komplexbildungskonstanten wurden die ΔG -Werte berechnet, womit man auch die Reaktionsentropien ΔS erhielt. Der Vergleich mit den analogen Protonassoziaten zeigt, dass CH_3Hg^+ eine wesentlich grössere Ionenentropie besitzt, also viel weniger stark "ordnungsproduzierend" auf die Molekeln des Lösungsmittels wirkt, als das Proton.

8. CH_3Hg^+ besitzt nur eine Koordinationsstelle, denn in keinem Falle war die Anlagerung eines zweiten Liganden nachzuweisen. Ein Vergleich mit dem Proton liegt deshalb nahe. Da sich CH_3Hg^+ aber wie ein B-Metallion verhält, spielt für die Stabilität seiner Komplexe nicht nur die Basizität des Liganden, wie bei den Protonassoziaten, eine Rolle, sondern die Komplexstabilität wächst stark mit sinkender Elektronegativität des Ligandatoms. Die gemessenen Komplexbildungskonstanten werden mit den Konstanten für die Assoziation eines Liganden B an die Ionen Ag^+ , HgB^+ und HgY^{2-} verglichen, die ein zu CH_3Hg^+ paralleles Verhalten zeigen.
9. Sulfid bildet mit Methylquecksilber einen mono-, einen bi- und einen trinuklearen Komplex. Ein protonierter Thiokomplex CH_3HgSH tritt nicht auf, da die Affinität von CH_3HgS^- zu einem weiteren CH_3Hg^+ viel grösser ist als dessen Basizität. Beim Ansäuern einer Lösung von CH_3HgS^- bildet sich daher $(\text{CH}_3\text{Hg})_2\text{S}$ und H_2S .